



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

**DIPARTIMENTO MATERNO- INFANTILE
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI NEONATOLOGIA E TIN**

Direttore F.F.

Dott. S. Moschella

Dirigenti

Dott.ssa A. Rocco

Dott.ssa C. Alfano

Dott.ssa M.L. Conelli

Dott.ssa A. De Gisi

Dott. M. Di Meo

Dott. M. Diplomatico

Dott.ssa C.S. Nigro

Dott. G. Russo

Dott.ssa L. Signoriello

Dott.ssa A. Sodano

Coordinatrice Infermieristica

C. Vedetta

Telefono

0825203435 (Direttore)

0825203436 (Coordinatrice)

0825203498 (Medico di Guardia)

0825203412 (Reparto)

0825203599 (Fax)

NIESPOLO CHRISTIAN nato il 24/01/24

Si raccomanda di allattare il neonato al seno "a richiesta" cioè tutte le volte che vuole. Il latte materno è in grado di soddisfare i fabbisogni per una buona crescita ed un normale sviluppo del neonato, è nutrizionalmente equilibrato e favorisce un'ottima relazione tra madre e bambino.

Un neonato a termine sano, recupera il peso della nascita nelle prime due settimane di vita. Solo in caso di vera carenza di latte materno e non prima di aver consultato il pediatra, integrare la dieta con **latte in formula HUMANA 1** 60 ml ogni 3 ore circa (1 misurino raso di polvere ogni 30 ml di acqua Oligominerale) (2 misurini in 60 ml di acqua; 3 misurini in 90 ml di acqua e così via) dopo il seno materno fino al raggiungimento dei 3 Kg.

PRESCRIZIONI TERAPEUTICHE:

Si raccomanda la medicazione del cordone ombelicale con **CLIAVIN SPRAY** 3-4 volte al giorno fino alla caduta e per le successive 48 ore, quindi previo parere del pediatra di famiglia è possibile fare il bagnetto

- Al cambio del pannolino applicare **D-TOPIC**
- Per tutto il primo anno di vita **PEDIATRE DHA**: 4 gocce al giorno per via orale
- Per i primi 6 mesi **PERIALUX**: 5 gocce al giorno per via orale
- Per 3 mesi **FLORAGOLD** gocce: 5 gocce al giorno per via orale.
- Per i lavaggi del naso **ALUNEB KIT**
- Per la pulizia oculare: **LENIBEN** garze
- Per il bagnetto **DILCOIL**
- **Piulatte**: 1 bst al giorno alla mamma

Alcune raccomandazioni per prevenire la morte in culla del lattante (SIDS)

- Il bambino deve dormire a pancia in su (supino)
- Non bisogna fumare nell'ambiente in cui soggiorna o dorme e nell'abitazione
- L'ambiente dove dorme non deve essere troppo caldo, (il microclima della stanza è ottimale quando la temperatura è compresa tra 18 e 20°C e quando un buon ricambio d'aria permette che l'umidità sia intorno al 50%) non deve essere coperto eccessivamente e deve dormire lontano da fonti di calore
- In caso di febbre il bambino deve essere coperto di meno
- Si consiglia di far dormire il bambino nella stanza dei genitori
- Evitare inoltre luoghi affollati

APPUNTAMENTI

- Controllo presso il pediatra curante entro 5-7 giorni dalla dimissione.
- Ecografia delle anche entro le prime 6 settimane di vita
- Vaccinazioni secondo calendario di legge

Torna a scuola il 23.2.24 ore 12 (dopo le 12 ore)

Il Neonatologo